

Vaccinaties bij IBD-patiënten

ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Informatiebrochure



Inleiding

*Patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa hebben door het innemen van **immuunonderdrukkende medicatie**(*) een verhoogd risico op infecties.*

U kan zich best zo goed mogelijk beschermen daartegen, door enerzijds hygiënische maatregelen toe te passen, ondervoeding voorkomen, maar ook door vaccinaties.

Deze worden besproken met uw arts/verpleegkundige vooraleer u een behandeling wordt opgestart. Een vaccinatieschema zal worden uitgewerkt, afhankelijk van de ziekteactiviteit en soort behandeling die u krijgt.

() corticoiden (medrol®), imuran®, purinethol®, methotrexate®, biologicals zoals remicade/remcima®, entyvio®, humira/hulio/hyrimoz/amgevita/imraldi®, stelara®, xeljanz®,..*

Overzicht

We splitsen de vaccins op in 'levende verzwakte en niet-levende vaccins'.

De levende verzwakte vaccins mogen niet toegediend worden tijdens immuun suppressieve therapie. Ze moeten 1 maand voor opstart of 1 à 3 maanden (afhankelijk van behandeling) na stopzetten van de therapie gegeven worden. Dit omdat ze aanleiding zouden kunnen geven tot de infectieziekte, waarvoor ze u eigenlijk zouden moeten beschermen.

NIET LEVENDE VACCINS

INFLUENZA OF GRIEP

- Influxac tetra ® 16.55 €
(2.45 € remgeld voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, mits speciale vermelding op voorschrift en 4.08 € voor anderen)
- Alpharix tetra® 16.55 €
(6.77 € in geval van terugbetaling)

U laat zich best jaarlijks vaccineren tegen griep, en dit tussen half oktober en half december. Het risico op besmetting is niet alleen groter, ook het verloop van de ziekte kan veel ernstiger zijn.

Het beste tijdstip is niet bepaald, maar wordt aangeraden ongeveer 5 dagen voor volgende therapie.

PNEUMOKOKKEN

- Prevenar 13 90.00 €
- Pneumovax 23 39.50 €

De pneumokok is een agressieve bacterie, die vooral long- en hersenvliesontstekingen kan veroorzaken. Er wordt dan ook sterk aangeraden deze vaccinatie te laten zetten.

Deze 2- ledige vaccinatie wordt gezet met een tussentijd van minimum 8 weken, en nadien wordt pneumovax 2 elke 5 jaar herhaald.

Patiënten die in het verleden reeds een inspuiting met pneumovax 23 kregen maar nog niet met prevenar 13, worden geadviseerd deze laatste pas toe te dienen na 1 jaar.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van deze vaccinatie mogelijk via uw ziektefonds. (+/- 25 €).

HPV OF HUMAAN PAPILOMAVIRUS

- Cervarix® 69.14 € of gratis via vaccinet of school voor 15 jaar 2x met tussentijd van 6 maand en na 15 jaar 3x met tussentijd van 1 en 6 maand
- Gardasil® 134 € 3x met tussentijd van 2 en 6 maand

HPV is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze kan leiden tot (genitale) wratten, maar ook tot kanker van anus, baarmoeder, penis, mond en keel. De vaccinatie werd vanaf 2002 gestart via CLB, en dit voor de leeftijd van 15 jaar en eerste seksuele betrekkingen. Ze bestaat uit 3 inspuitingen over een periode van 6 maanden.

Sinds 2010-2011 biedt de Vlaamse Overheid het vaccin gratis aan voor alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Het gaat om een aanbod en geen verplichte vaccinatie.

TOT SLOT

De weergegeven prijzen voor vaccinaties zijn slechts een geschatte kostprijs op basis van de voor ons beschikbare info in 2021 !

Vaccinaties worden door de huisarts geregistreerd in vaccinet en zijn ook terug te vinden in Cozo.

Een regelmatige update van uw dossier is vanzelfsprekend van belang.

CONTACT / VRAGEN

Hebt u vragen, contacteer dan de [IBD- verpleegkundige](#) ann.bommerez@sintandriestielt.be of 051 42 56 91

Het secretariaat inwendige ziekten kan u in geval van afwezigheid ook contacteren interne@sintandriestielt.be of 051 42 51 60

Interessante websites:

- www.laatjevaccineren.be
- www.ibdpassport.com
- www.myhealthviewer.be
- www.mijngezondheid.be





Uw gezondheid, onze zorg.

IBD - verpleegkundige
051 42 56 91

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

16/05/22

